

Pacient č.1

žena. nar. 2002

T.P.2002

- Otec CN, IC resekce
- 2009 hospitalizována pro bolesti břicha a neprospívání
- 2010 hospitalizována pro průjmy , koloskopie s negativním nálezem, gastroskopie a biopsie z duodena dg. Celiakie (Marsh 1)
- 2011 koloskopie dg. CN v oblasti TI
- 2011-2013 opakované koloskopie ulcerace v oblasti TI terapie Imuranem, intermitentně kortikoidy (budesonid, prednison)

T.P.2002

- Listopad 2013 zavedena biologická léčba (infliximab) standardní režim, s dobrým efektem
- Září 2014 extirpace mateřského znaménka na levém předloktí, dg. nízké rizikový melanom
- Duben 2015 susp. orbitocelulitida, léčena ATB
- terapie Imuran tbl 75 mg denně a Remicade a 8 týdnů
- Září 2015 mokvající ekzematózní ložiska za ušima a v sakrální lokalizaci



T.P.2002

- Červen 2015 dermatologické vyšetření „impetiginizovaná atopická dermatitida“
- Rozšíření ložisek na ušní boltce, intergluteálně, perinázálně a v nosních vchodech (Staphylococcus hominis)
- Srpen 2015-července 2016 recidivující pyodermie na hýždích, stehnech nutná chirurgická intervence pyoderma gangrenózum
- Srpen 2016 alopetická ložiska ve kštici

T.P.2002

- Vyšetřena dermatologem as. Jůzlovou dermatovenerologická klinika Na Bulovce
- Hb115g/l, leu 7.4, trombo 309, CRP 2.4mg/l Vit B12 470; Ferritin 33 umol/l
- AEM neg; TG IGA1,2U/ml; AGI IGA 6U/ml
- Dop. doplnit MR enterografii
- Ukončit terapii Imuranem i podávání biologické léčby
- Zahájit léčbu MTX

Enterografie 17.10.2016



Průběh nemoci v roce 2017

- MTX 20 mg s.c. 1x týdně
(nausea, zvracení, únava)
- MTX 10mg s.c. 1x týdně (v červnu 2017
terapie ukončena, souhlasí s operací)
- Laparoskopicky asistovaný výkon domluven s
prof. R.Škábou v Motole

Průběh hospitalizace



- **Příjem 27. 5. 2018**
 - Bez střešní přípravy
 - Strava do 6 hodin od operace, čiré tekutiny do 2 hodin od operace
 - ATB profylaxe
- **Operace 28. 5. 2018**
 - Laparoskopicky asistovaná ileocékální resekce (IC)
 - Anastomóza ileokolická end to end v jedné vrstvě
 - 3 vstupy do dutiny břišní (rána v pupku rozšířena k extrakci IC oblasti - 3 cm)
 - Délka operace 120 min., krevní ztráta 30 ml, resekce 40 cm terminálního ilea
 - Výkon v kombinaci celkové anestézie + epidurální analgezie (EDK)
- **Pooperační průběh**
 - Standardní
 - Analgezie kombinace - i.v a EDK
- **Dimise 4. 6. 2018**
 - Rány se hojí PPI, bolesti minimální
 - Stravu a tekutiny toleruje, pasáž GIT obnovena



